

**FERTILIZANTE INORGANICO  
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**  
Nº de Registro: RSCO-002/I/17

**Titular del Registro: ANASAC MEXICO, S. DE R.L DE C.V  
País: MÉXICO**

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**

**Elemento:**

<b>FÓSFORO (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) .....</b>	<b>20% p/p</b>
<b>POTASIO (K<sub>2</sub>O) .....</b>	<b>16% p/p</b>

**GENERALIDADES**

**PK PLUS** es un fertilizante líquido a base de Fósforo y Potasio que posee un alto poder de translocación de sistema, por lo que se incorpora fácilmente al flujo de la savia.

**RECOMENDACIONES DE USO**

CULTIVO	DOSIS (Lt/ha)	OBSERVACIONES
Uva de mesa, Uva vinífera	0,7-1	3 a 5 aplicaciones desde prefloración. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fungica.
Durazno	0,7-1	3 a 5 aplicaciones cada 15 días, previo a cosecha. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fungica.
Peral, Manzano	0,7-1	3 a 5 aplicaciones cada 15 días, previo a cosecha. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fungica.
Cucurbitáceas	0,7-1	3 aplicaciones desde inicio de cuaje de los primeros frutos. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fungica.
Ajo y Cebolla	0,7-1	2-3 aplicaciones desde inicio formación de bulbo. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fungica.
Jitomate y Pimiento	0,7-1	3 aplicaciones desde inicio de cuaje de los primeros frutos. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fungica.
Esparrago	0,7-1	Aplicar 40 días previo a desvarar. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fungica.
Mango	0,7-1	3 a 5 aplicaciones cada 15 días, previo a cosecha. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fungica.

Cítricos	0,7-1	2-3 aplicaciones cada 15 días desde llenado de frutos. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Leguminosas	0,7-1	2-3 aplicaciones cada 15 días en llenado de grano. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Hortalizas de hoja	0,7-1	3 a 5 aplicaciones según ciclo de producción. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Flores de corte	0,7-1	Aplicar previo a formación de botón floral, luego de rebrote. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Nogal	0,7-1	2-3 aplicaciones cada 15 días en crecimiento de fruto. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Aguacate	0,7-1	2-3 aplicaciones cada 15 días en crecimiento de fruto. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Piña	0,7-1	2-3 aplicaciones cada 15 días en crecimiento de fruto. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Papaya	0,7-1	2-3 aplicaciones cada 15 días en crecimiento de fruto. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Café	0,7-1	2-3 aplicaciones cada 15 días en crecimiento de fruto. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.
Plátano	0,7-1	2-3 aplicaciones cada 15 días en crecimiento de fruto. Aplicar de manera preventiva en momentos de alta infestación fúngica.

#### MÉTODO PARA PREPARAR Y APlicar EL PRODUCTO

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis del producto y termine de llenar el volumen del tanque de aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **PK PLUS** es incompatible con aceites minerales, compuestos cúpricos y productos muy alcalinos, además de dimetoato y dicofol. Esperar al menos 20 días entre su aplicación y la aplicación de productos con incompatibilidad. Solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados. Antes de realizar cualquier aplicación en mezcla con otros agroquímicos, deberá realizar una prueba previa de compatibilidad.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Al aplicar **PK PLUS** utilice ropa protectora, guantes, gafas y respirador apropiado. No aplicar en horas de máximo calor. Almacenar en este mismo envase, en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.

#### PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”.

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”.

"EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO".

### PRIMEROS AUXILIOS

Medidas inmediatas a tomarse en caso de ingestión accidental, contacto cutáneo y contacto ocular con el producto.

En caso de existir contacto cutáneo deberá lavar el área infectada con abundante agua y jabón. Deberá consultar al médico especialista para el tratamiento sintomático en caso de que las molestias persistan.

En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito, enjuagar la boca suficientes veces sin ingerir el líquido y no ingerir alimentos o bebidas que no hayan sido recetados por el médico. Deberá consultar al médico especialista para el tratamiento sintomático en caso de que las molestias persistan.

En caso de existir contacto entre el producto y los ojos, deberá enjuagar mínimo por 10 minutos con los ojos abiertos bajo el contacto continuo y directo del chorro de agua. Deberá consultar al médico especialista para tratamiento sintomático en caso de que las molestias persistan.

### MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

"RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO".

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD".

"RESPETE LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS".

"NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUE VACIOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RIOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA".

"NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACION EN SUELOS, RIOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA".

"NO VIERTA EL AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN EN SUELOS, RIOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA".

"RESPETE LAS DOSIS Y EPOCA DE APLICACION DEL PRODUCTO".

PRESENTACIONES: \_\_\_\_\_

#### Titular del registro:

**ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

San Borja 1208, Col. Narvarte, Delegación  
Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México  
Tel: 55 5559 4734

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONA INEXPERTAS"  
"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD"  
"REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"  
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS"  
"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"  
"NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO"  
"NO USE EL PRODUCTO EN FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN ESTA ETIQUETA"



"ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

#### INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

**ANASAC MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**, garantiza que el producto fue formulado bajo óptimas condiciones cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por cada país, así como también con las concentraciones de ingredientes

activos que se detallan en la etiqueta y hoja informativa. El vendedor garantiza que el producto fue almacenado en óptimas condiciones, sin embargo, no ofrece garantía por el resultado del producto ya que las aplicaciones están sujetas a condiciones ambientales variables que no son necesariamente las mismas en las cuales el producto fue probado. El comprador acepta ser el responsable de todos los riesgos que pueda provocar el mal uso y manejo del producto si no sigue las indicaciones en la presente etiqueta, comprometiéndose a almacenar el producto en las condiciones indicadas en la misma. El usuario es el responsable de la correcta manipulación y aplicación del producto, así como también de usarlo en los cultivos y dosis considerando las tolerancias de residuos que la etiqueta indica, siguiendo las recomendaciones de la misma.